

使用上の注意改訂のお知らせ

2014年 9月

HMG-CoA還元酵素阻害剤

ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KO」
ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KO」
ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KO」



寿製薬株式会社

長野県埴科郡坂城町大字上五明字東川原 198

PITAVASTATIN CALCIUM TAB. 1mg「KO」
PITAVASTATIN CALCIUM TAB. 2mg「KO」
PITAVASTATIN CALCIUM TAB. 4mg「KO」
(ピタバスタチンカルシウム製剤)

この度、『ピタバスタチンカルシウム錠 1mg「KO」』、『ピタバスタチンカルシウム錠 2mg「KO」』及び『ピタバスタチンカルシウム錠 4mg「KO」』につきまして、【使用上の注意】の改訂を行いましたので、ご案内申し上げます。今後のご使用につきましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品のご使用にあたって、副作用などの治療上好ましくない有害事象をご経験の際には、弊社医薬情報担当者までできるだけ速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

I. 改訂内容 (——部が削除箇所)

改訂後	改訂前
<p>【自主改訂】</p> <p>【用法・用量】</p> <p>通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回経口投与する。</p> <p>なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。</p>	<p>【自主改訂】</p> <p>【用法・用量】</p> <p>通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回夕食後に経口投与する。</p> <p>なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。</p>

II. 改訂理由

- 自主改訂：
ピタバスタチンカルシウム錠 1mg「KO」及びピタバスタチンカルシウム錠 2mg「KO」の【用法・用量】一部変更の為（承認日：平成26年3月10日）
- 自主改訂：
ピタバスタチンカルシウム錠 4mg「KO」の【用法・用量】一部変更の為（承認日：平成26年8月25日）

流通在庫の関係から、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに若干の日数が必要ですので、ご使用に際しましては、こちらにご案内申し上げました改訂内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。